



Regione Umbria

Servizio Fitosanitario Regionale

Bollettino Fitosanitario VITE n. 10 del 17/07/2018

PERUGIA E TERNI

Fase fenologica: BBCH 79 – Chiusura grappolo

Fonte RETERURALE (<https://www.reterurale.it/documentifeno>)



PERONOSPORA

Presenza di peronospora nell'area del Trasimeno, Narni, Orvieto, Montefalco, Colli Perugini-Torgiano (Dati Progetto Smartmeteo - <http://cratia.it/smartmeteo/>). In presenza di prolungate bagnature intervenire preferibilmente con prodotti rameici in funzione della persistenza delle s.a. utilizzate nel precedente trattamento fitosanitario.

OIDIO

Si consiglia di abbinare al trattamento antiperonosporico Zolfi bagnabili, Bupirimate, IBE, Metrafenone, Quinoxifen, Cyflufenamide, Spiroxamina ecc., assicurando una copertura continua in funzione della persistenza del prodotto fitosanitario precedentemente utilizzato oppure intervenire con zolfo in polvere.

TIGNOLETTA DELLA VITE

Fase decrescente del volo della 2 generazione carpofoaga. Si registrano catture ridotte nelle trappole monitorate dal Progetto Smartmeteo. Eventuali interventi al superamento della soglia del 10-15% di uova e larve.

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

Per coloro che aderiscono alle misure agroambientali della Regione Umbria il Disciplinare di difesa integrata per l'anno 2017-2018 è disponibile al seguente link:

<http://www.regione.umbria.it/documents/18/12682939/frutticole.pdf/4534326f-0526-4c0b-bb33-bcc0a711bbe4>